



MONOGRAPH

**CIENTIFIC RESEARCH
IN MODERN CONDITIONS
OF INSTABILITY '2023**



**Book 24
PART 3**

SWorld

Germany



Burlaka I., Sokolov V., Zelenko Y., Zvonska L., Kutishchev P.S. et al.

**WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UNTER
MODERNEN BEDINGUNGEN DER INSTABILITÄT**
BILDUNG UND PÄDAGOGIK, PHILOLOGIE, PSYCHOLOGIE UND SOZIOLOGIE,
MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN, BIOLOGIE UND ÖKOLOGIE, LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI UND WASSERWIRTSCHAFT

***SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS
OF INSTABILITY***

EDUCATION AND PEDAGOGY, PHILOLOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY,
MEDICINE AND HEALTHCARE, BIOLOGY AND ECOLOGY, AGRICULTURE, FORESTRY,
FISHERIES AND WATER MANAGEMENT

*Monographic series «European Science»
Book 24. Part 3.*

*In internationalen wissenschaftlich-geometrischen Datenbanken enthalten
Included in International scientometric databases*

MONOGRAPHIE
MONOGRAPH

*ScientificWorld-Net Akhat AV
Karlsruhe 2023*

Authors:

Kryvtsun N.Z. (1), Snitovska O.Y. (2), Zvonska L. (3), Bedan V. (4),
Burlaka I. (5), Sokolov V. (6), Rozhkovska G. (6), Dorofeeva T. (6),
Tsvigovskiy V. (6), Korsun O. (6), Dius O. (6), Dolgushyn O. (6),
Bezovska M. (7), Zelenko Y. (7), Garmash S.M. (8),
Kutishchev P.S. (9), Honcharova O.V. (9), Kovtun O.V. (10)

Reviewers:

Chernyukh B.V., D. of philol., Prof., Ivan Franko National University of Lviv (3)
Chekareva E.S., D. of philol., Prof., V. N. Karazin Kharkiv National University (3)
Myroslav Maliovanyi, PhD, Prof., The Head of the Department of Ecology and Sustainable Environmental Management, Lviv Polytechnic National University (7)
Hrynevych Nataliia E., Doctor of veterinary sciences, professor, head of the Department of ichthyology and zoology, Bila Tserkva National Agrarian University (9)
Pichura Vitalii I., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, head of Department of Ecology and Sustainable Management named after Professor Yu.V. Pilipenka, Kherson State Agrarian and Economic University (9)

Wissenschaftliche Forschung unter modernen Bedingungen der Instabilität: Bildung und Pädagogik, Philologie, Psychologie und Soziologie, Medizin und Gesundheitswesen, Biologie und Ökologie, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Wasserwirtschaft. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 24. Teil 3. 2023.

Scientific research in modern conditions of instability: Education and pedagogy, Philology, Psychology and sociology, Medicine and healthcare, Biology and ecology, Agriculture, forestry, fisheries and water management. Monographic series «European Science». Book 24. Part 3. 2023.

**ISBN 978-3-98924-008-7
DOI: 10.30890/2709-2313.2023-24-03**

Published by:

ScientificWorld-NetAkhatAV
Lufstr. 13
76227 Karlsruhe, Germany
e-mail: editor@promonograph.org
site: <https://desymp.promonograph.org>

Copyright © Authors, 2023
Copyright © Drawing up & Design. ScientificWorld-NetAkhatAV, 2023



ÜBER DIE AUTOREN / ABOUT THE AUTHORS

1. *Kryvtsun Neonila Znoviyivna*, graduate student, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University - *Chapter 1*
2. *Snitovska Olga Yosypivna*, Candidate of Philological Sciences, associate professor, Danylo Halytsky Lviv National Medical University - *Chapter 2*
3. *Zvonska Lesia*, Doctor of Philological Sciences, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv - *Chapter 3*
4. *Bedan Viktoriia*, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, International Humanities University - *Chapter 4*
5. *Burlaka Ievgeniia*, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Bogomolets National Medical University - *Chapter 5*
6. *Sokolov Viktor*, Doctor of Medical Sciences, Professor, Odessa National Medical University - *Chapter 6 (co-authored)*
7. *Rozhkovska Galina*, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Odessa National Medical University - *Chapter 6 (co-authored)*
8. *Dorocheva Tamara*, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Odessa National Medical University - *Chapter 6 (co-authored)*
9. *Tsvigovskiy Viatcheslav*, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Odessa National Medical University - *Chapter 6 (co-authored)*
10. *Korsun Oleksandr*, Odessa National Medical University - *Chapter 6 (co-authored)*
11. *Diis Olena*, Odessa National Medical University - *Chapter 6 (co-authored)*
12. *Dolgushyn Oleg*, Odessa National Medical University - *Chapter 6 (co-authored)*
13. *Bezovska Maryna*, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Ukrainian State University of Science and Technologies - *Chapter 7 (co-authored)*
14. *Zelenko Yuliya*, Doctor of Technical Sciences, Professor, Ukrainian State University of Science and Technologies - *Chapter 7 (co-authored)*
15. *Garmash Svitlana Myckolaevna*, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Ukrainian State University of Chemistry and Technology - *Chapter 8*
16. *Kutishchev Pavlo Serhiyovich*, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Kherson State Agrarian and Economic University - *Chapter 9 (co-authored)*
17. *Honcharova Olena Viktorivna*, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Kherson State Agrarian and Economic University - *Chapter 9 (co-authored)*
18. *Kovtun Olena Volodymyrivna*, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Lviv National Environmental University/docent - *Chapter 10*

**CHAPTER 4****PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MODERN WOMAN MANAGER**

Introduction	40
4.1. Review of modern studies of the professional activity of a female manager.....	41
4.2. Organization of an empirical study of the individual and psychological properties of a female manager.....	45
4.3. The influence of the individual and psychological characteristics of the female manager's personality on the effectiveness of managerial activities.....	47
Conclusions	49

CHAPTER 5**THE NETWORK OF FUNCTIONAL AND METABOLIC DISORDERS IN CHILDREN WITH DIABETIC NEPHROPATHY**

Introduction	50
5.1. Clinical characteristics of children with DN.....	52
5.2. Basic kidney function and compensation of T1D parameters in children with DN.....	53
5.3. Endothelin-1 and metabolic disorders in children with DN	54
5.4. Discussion.....	56
Conclusions	59

CHAPTER 6**POSSIBILITIES OF MSCT, MRI IN COMPARISON WITH THE DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF THE TWO METHODS IN THE DETECTION OF MALIGNANT FORMATIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY.....60****CHAPTER 7****PRINCIPLES OF ASSESSING THE RESOURCE POTENTIAL OF OIL-CONTAINING WASTE OF RAILWAY INFRASTRUCTURE**

Introduction	70
7.1. Concept of resource potential.....	71
7.2. Physical criteria for resource potential assessment.....	74
7.3. Specificity of chemical assessment criteria	76
7.4. A set of technological criteria for resource potential assessment.....	81
7.5. Specificity of assessment of chemical and technological criteria for oil sludge of railway infrastructure enterprises	83
Conclusions	85



KAPITEL 6 / CHAPTER 6⁶

POSSIBILITIES OF MSCT, MRI IN COMPARISON WITH THE DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF THE TWO METHODS IN THE DETECTION OF MALIGNANT FORMATIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY

DOI: 10.30890/2709-2313.2023-24-03-003

Об'єкт дослідження. Було обстежено понад 400 хворих, детальному розбору піддалися 240 хворих з пухлинами підшлункової залози, середній вік яких становив 55 +/- 2,6 років.

Мета роботи полягала в ознайомлені широкого кола фахівців з використанням різних методик рентгенологічного дослідження при різноманітних пухлинних ураженнях, визначення методологічних підходів до виявлення патології, обґрунтування тієї чи іншої методики використання, і встановлення рентгенодіагностичної семіотики.

Матеріал та методи. Нами використовувались різні методики обстеження, розпочинаючи від стандартної рентгенографії органів черевної порожнини та закінчуячи сучасними методами дослідження, такими як УЗД, РПХГ, КТ, МСКТ, МРТ, ПЕТ/КТ. З великої кількості обстежуваних хворих (понад 400) детальному розбору підлягали хворі з пухлинами підшлункової залози – 240. Середній вік становив 55+/- 2,6 років. У низки пацієнтів ускладнення верифіковані. Більшість спостережень піддані статистичній обробці.

Результати. Дифузійно-зважена МРТ здатна оцінити процеси в організмі людини на клітинному рівні та надає інформацію про позаклітинний простір, кількість клітин в тканині і стан цілісності плазмалемми, дозволяє візуалізувати внутрішньо- та трансцелюлярний броунівський рух молекул води в біологічних тканинах.

Висновки. УЗД дозволяє визначити форму, контури підшлункової залози. Спіральна КТ з болюсним введенням контрасту більш точно диференціює пухлинні утворення. Чутливість КТ в діагностиці злоякісних пухлин ПЗ

⁶Authors: Sokolov Viktor, Rozhkovska Galina, Dorofeeva Tamara, Tsvigovskiy Viatcheslav, Korsun Oleksandr, Dius Olena, Dolgushyn Oleg



перевищує 80%. Частота хибнопозитивних результатів складає 5-10%. МРТ переваг перед КТ немає. Однак інші автори вважають, що діагностична ефективність МР-томографії в поєднанні з МР-ангіографією порівняна з діагностичною ефективністю двофазної спіральної КТ з динамічною контрастністю при оцінці судинної інвазії пухлин ПЗ. РПХГ є методом вибору для уточнення інфільтрації пухлинним процесом 12 палої кишкі і жовчновивідних шляхів. Найбільш достовірним методом є прицільна біопсія ПЗ під контролем УЗД і КТ.

Рак підшлункової залози, за даними ВООЗ, складає 10 випадків на 100 000 населення. Кожен другий випадок діагностованого в клініках раку підшлункової залози закінчується летальним результатом. Висока частота народження злоякісних пухлин підшлункової залози особливо характерна для осіб старше 60 років. Точна і своєчасна діагностика раку підшлункової залози є однією з найскладніших проблем сучасної променевої діагностики, незважаючи на використання і впровадження в практику нових ультразвукових технологій, комп'ютерної томографії, СКТ-ангіографії, магнітно-резонансної томографії, холангіопанкреатографії. (Данилов М.В. та ін., 1995; Митьков В.В., 1996; Кунцевич Г.І. та ін., 1998; Зубарев А.В., 2001; Кармазановський Г.Г., 2001; Koito K. et al., 1998; SJ Diehl, KJ Lehmen, M. Sadick, R. Lachmann, 1998). Однією з причин пізньої діагностики раку підшлункової залози є відсутність патогномонічних симптомів (Колесникова Е.К., 1993; Кравець, Л..М.1994; AJ Megibow, XH Zhou, H. Rotterdam et al, 1995 Кармазановський Г.Г., 2001.). Інфільтративний ріст пухлини голівки підшлункової залози призводить до обструкції холедоху, вірсунгова протока, до механічної жовтяниці, виникає необхідність її диференціації від інфекційного гепатиту, пухлин великого дуоденального сосочка, воріт печінки, стенозів холедоха, пухлин дванадцятапалої кишкі. У зв'язку з широким вибором сучасних променевих методів діагностики виникає необхідність вивчення роздільної здатності кожного з них, комплексного використання і розробки алгоритму променевої діагностики. Таким чином, незважаючи на впровадження в широку практику



УЗД, УЗД з КДК, інших нових ультразвукових технологій, рентгенівської комп'ютерної томографії, МРТ, проблема ранньої діагностики захворювань і пухлин підшлункової залози, диференціальної діагностики механічної жовтяниці залишається актуально.(SL et al., 1997).

Стандартний метод, ретроградна холангіопанкреатографія, виявляє патологію лише в межах голівки підшлункової залози. Найбільш достовірними способами є комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія. Найбільш перспективним методом діагностики є спіральна комп'ютерна томографія.

Мета цієї роботи полягає в ознайомленні широкого кола фахівців з використанням різних методик рентгенологічного дослідження, при різноманітних пухлинних ураженнях, визначення методологічних підходів до виявлення патології, обґрутування тієї чи іншої методики використання, і встановлення рентгендіагностичної семіотики.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Нами використовувалися різні методики, починаючи від стандартної рентгенографії органів черевної порожнини закінчуючи сучасними методами дослідження, такими як УЗД, РПХГ, КТ, МСКТ, МРТ, ПЕТ / КТ. З великої кількості обстежуваних хворих (понад 400) детальному розбору піддалися хворих з пухлинами підшлункової залози - 240. Середній вік становив $55 \pm 2,6$ років. У низки пацієнтів ускладення верифіковані. Більшість спостережень піддані статистичній обробці.

Показання до КТ підшлункової залози: виявлення пухлини, можливість резекції (наявність інвазії судин), локалізація пухлин підшлункової залози, онкологічне простеження, відповідь на лікування, підозра на рецидив.

Рекомендовані фази контрастного посилення при КТ: артеріальна-панкреатична фаза, паренхиматозная фаза, портална фаза

Для МРТ-зображень характерно:

- Т1 - зниження інтенсивності МР-сигналу від паренхіми підшлункової залози;
- Т2-ВІ з придушенням сигналу від жирової тканини: осумкована рідина,



псевдокісти, ділянки некрозу дають МР-сигнал підвищеної інтенсивності.

Для діагностики пухлинних захворювань підшлункової залози останнім часом стали використовуватися методи ДВІ / МРТ.

Результати. Дифузійно-зважена МРТ здатна оцінити процеси в організмі людини на клітинному рівні надає інформацію про позаклітинному просторі, кількості клітин в тканині і стан цілісності плазмалемми, дозволяє візуалізувати внутрішньо-і трансцеллюлярний броунівський рух молекул води в біологічних тканинах. При використанні ДВІ введено поняття вимірюваного коефіцієнта дифузії (ІКД). ІКД є градієнт кривої, яка будується при зіставленні значень b по осі x і \log відносної інтенсивності сигналу тканини по осі y . ІКД виражається в міліметрах квадратних в секунду. Значення ІКД можна визначити автоматично, обвівши на мапі область інтересу. ДВІ отримували при значеннях $b = 50 \text{ с} / \text{мм}^2$, $400 \text{ с} / \text{мм}^2$, $800 \text{ с} / \text{мм}^2$. Для кожного вогнища визначався ІКД (вимірюваний коефіцієнт дози) на картах ІКД. • Чим ширше міжклітинні простору, тим вільніше дифузія. Дифузійно-зважена МРТ здатна оцінити процеси в організмі людини.

ДВІ над пухлиною:

- У солідних пухлинах кількість і щільність розташування клітин вище, ніж в нормальніх тканинах, що призводить до зменшення клітинних просторів і до зниження дифузії в пухлинах.
- У злюкісних пухлинах щільність клітин вище, ніж в доброкісних і дифузія знижена більшою мірою ЕРХП (ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія). Вона передбачає введення контрастної речовини в панкреатичний протік з боку кишечника і дозволяє визначити на рентгенівському екрані звужену частину протоки. Лікар може ввести в цю частину протоки розширювачі і потім пластикову трубку, яка забезпечить нормальній відтік жовчі, і зніме прояви жовтяниці.

Критерій операбельності РПЗ - відсутність віддалених метастазів, в той час як критерії резектабельності включають цілий ряд факторів. Розглядаючи критерії поширеності пухлини на судини, особливу увагу слід приділити ступеня



інвазії в основні артеріальні стовбури: - (печінкова артерія, верхня брижова артерія, черевний стовбур), так як справжня інвазія в дані структури є абсолютним протипоказанням до радикального втручання. Залучення гілок інших великих судин, таких як гастродуоденальна, селезіночна артерія і ін. Не є протипоказанням до резекції. Часткова венозна інвазія не є абсолютним протипоказанням до радикальної операції.

При всій схожості критеріїв тієї чи іншої шкали в рекомендаціях MDAAnderson Cancer Center критерії нерезектабельних і прикордонної резектабельності більш конкретні, білатеральний стеноз верхньої брижової / ворітної вени не є ознакою нерезектабельних, унілатеральної деформація верхньої брижової і ворітної вени без включення усть гілок верхньої брижової вени не є ознакою навіть прикордонної резектабельності. Тобто критерії M.D. Anderson Cancer Center в цілому допускають великі можливості для хірургічного методу лікування хворих на рак підшлункової залози.




Рис. 1 - МСКТ і ДВІ над пухлиною ПЖ (Choietal., 2014 року).

Артеріальні судини




Рис.2 - Пухлина прилягає до стінки і кут менше 180 градусів. Пухлина резектабельна




Рис.3 - Пухлина прилягає до стінки і кут менше 180 градусів. Пухлина резектабельна.




Рис.4 - Посудина оточена пухлиною більше 75%: малоймовірна резектабельность



Контури пухлин по відношенню до венозних судинах

Вивчаючи численні дані, ми встановили, що венозне зачленення є функцією розташування пухлини, а не показником агресивної біології пухлини критерій резектабельності.




Рис. 5 - Нерівність контуру - зачленення порталальної вени. Пухлина резектабельна




Рис.6 - Залучення венозних судин. Пухлина резектабельна




Рис.7 - Пухлина з двох сторін, звуження просвіту порталної і селезінкової вен. Нерезектабельна. Більше 75% окружності




Рис.8 - Всі судини залучені в метастатичний процес.
Пухлина нерезектабельна.

Діагностика метастатичного ураження лімфатичних вузлів.

Критеріями метастатичного ураження лімфатичних вузлів, розташованих в басейнах лимfovідтоку у відповідність з локалізацією пухлини, є:

- збільшення лімфатичних вузлів більше 2,0 см в діаметрі незалежно від їх кількості,
- множинне ураження лімфатичних вузлів більше 1,0 см в діаметрі



- конгломерація лімфатичних вузлів.

Діагностика гематогенного метастазування.

Гематогенні метастази виявляються у 37,8% хворих. Частота гематогенного метастазування в різні органи: печінка – 21,4%, легені-11,5%, наднирники – 10,4%, селезінка – 9,6%, очеревина – 8,2%, сальник – 7,4%, хребці – 2,6%, яєчники – 1,1%.




Рис. 9 - Метастази в параортальні лімфатичні вузли.

Згідно даних літератури, в підшлункову залозу можуть метастазувати рак легень, молочної залози, щитоподібної залози, нирок (дифузне дрібновузкове, осередкове або солітарне ураження. Гіпоінтенсівні на Т1 і гіперінтенсивні на Т2-ВІ. Залежно від розмірів - однорідне або кільцеподібне посилення може симулювати картину гіперваскулярної островковоклітинної пухлини, яєчників, яєчок, печінки і меланома (добре обмежені вогнища, гіперінтенсивні на Т1 за рахунок відкладень меланіну). Також може спостерігатися і пряме проростання в залозу пухлин шлунка, товстої кишki, жовчного міхура, печінки, нирки.



Висновки

- Спіральна КТ з болюсним введенням контрасту більш точно диференціює пухлинні утворення.
- Чутливість КТ в діагностиці злоякісних пухлин підшлункової залози перевищує 80%. Частота хибнопозитивних результатів складає 5-10%.
- МРТ переваг перед КТ не має.
- Однак інші автори вважають, що діагностична ефективність МР-томографії в поєднанні з МР-ангіографією порівнянна з діагностичною ефективністю двухфазної спіральної КТ з динамічною контрастністю при оцінці судинної інвазії пухлин підшлункової залози.



SCIENTIFIC EDITION

MONOGRAPH

WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UNTER MODERNEN BEDINGUNGEN DER INSTABILITÄT

BILDUNG UND PÄDAGOGIK, PHILOLOGIE, PSYCHOLOGIE UND SOZIOLOGIE,
MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN, BIOLOGIE UND ÖKOLOGIE, LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI UND WASSERWIRTSCHAFT

SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS OF INSTABILITY

*EDUCATION AND PEDAGOGY, PHILOLOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY, MEDICINE
AND HEALTHCARE, BIOLOGY AND ECOLOGY, AGRICULTURE, FORESTRY,
FISHERIES AND WATER MANAGEMENT*
MONOGRAPHIC SERIES «EUROPEAN SCIENCE»
BOOK 24. PART 3

Authors:

Kryvtsun N.Z. (1), Snitovska O.Y. (2), Zvonska L. (3), Bedan V. (4),
Burlaka I. (5), Sokolov V. (6), Rozhkovska G. (6), Dorofeeva T. (6),
Tsvigovskiy V. (6), Korsun O. (6), Dius O. (6), Dolgushyn O. (6),
Bezovska M. (7), Zelenko Y. (7), Garmash S.M. (8),
Kutishchev P.S. (9), Honcharova O.V. (9), Kovtun O.V. (10)

The scientific achievements of the authors of the monograph were also reviewed and recommended for publication at the international scientific symposium
«Wissenschaftliche Forschung unter modernen Bedingungen der Instabilität '2023 /
Scientific research in modern conditions of instability '2023»
(November 30, 2023)

Monograph published in the author's edition

The monograph is included in
International scientometric databases

500 copies
November, 2023

Published:
ScientificWorld-NetAkhatAV
Lufstr 13,
Karlsruhe, Germany



e-mail: editor@promonograph.org
<https://desymp.promonograph.org>

ISBN 978-3-989240-08-7

